



Copyright:

Städtisches Gymnasium Beverungen,
Hans Barth, Lars Dierkes, Ruben Vornholt,
Beverungen im Januar 2000

Tab. 10: Entwicklung des Sikawildes im Weserbergland nach Rassenkreis - spezifischen Merkmalen (cm)

Merkmale:	Stammhirsch 6 Jahre (1936)	Hirsch (1954)	Hirsch (1965)	Hirsch (1967)	Hirsch (1976)	Hirsch (1981)	Hirsch (1992)	Hirsch (1997)
Stangenlänge L :	70,5	60,3	51,5	56,9	65	58	63,8	68
Stangenlänge R :	64,5	60,4	48	43,8	67,3	60	62,3	63,1
Rosenstockumf. L :	15,6	14	12,9	13,2	17,2	14,4	15,4	20,1
Rosenstockumf. R :	15,4	16,2	12,8	14,4	17,3	15,3	15,6	19
u. Stangenumf. L :	9,5	9,8	7	8	10,5	7,2	8,7	11,6
u. Stangenumf. R :	9,5	9,3	7	8,5	10,3	7,8	8,4	10,9
o. Stangenumf. L :	9,8	8,7	6,8	7,6	11,2	7,6	7,8	9
o. Stangenumf. R :	9,1	10,7	6,4	6,5	12	6,9	8	9,8
Augsprosse L :	20,2	17,8	17	13	14,4	13,4	13,2	4,4
Augsprosse R :	19,5	17,3	16	15	16,1	14,8	11,9	4,1
Mittelsprosse L :	13,5	21,6	13,8	10,6	15	15,6	12,7	21
Mittelsprosse R :	12,5	17,1	13,3	13,1	19	4,0	15,3	22
Kronensprosse L :	11,5	11,1	4,8	5	11,3	8,4	9,3	16,7
Kronensprosse R :	13,2	13,2	2,1		12,7	6,8	9	18,6